

Normativa higiénico-sanitaria

Higiene

Se deben guardar unas normas estrictas de higiene diaria.

Es importante cortar las uñas siempre que sea necesario, para evitar que puedan arañar a sus compañeros y compañeras.

Desde la Escuela se aplicarán los protocolos higiénico-sanitarios marcados desde SALUD.

Enfermedades

Para evitar contagiar al resto del grupo y por los cuidados especiales que necesitan, **una niña o un niño enfermo no deberá acudir a la Escuela Infantil** en los siguientes casos:

De forma general, y siguiendo el protocolo marcado por SALUD, dado el momento epidemiológico en el que nos encontramos, la criatura **NO** deberá acudir a la Escuela aunque no haya un diagnóstico concreto, si presenta algunos de los siguientes síntomas: **fiebre, síntomas respiratorios de vías altas, mal estar general, diarreas, vómitos, dolor de garganta, granitos en el cuerpo**. Debiéndose poner en contacto de forma telefónica con su centro de salud para valoración, aunque los síntomas sean muy leves o escasos (por ej un vómito o solo una diarrea).

Si la detección de la enfermedad se realizara durante la permanencia en la Escuela, se avisará a la familia para venir a recoger al niño o la niña y se informará con posterioridad de cual ha sido su valoración o diagnóstico.

Medicamentos

Como consecuencia de lo anterior, no se administrarán medicamentos en la escuela infantil.

| INFECCIONES MAS FRECUENTES EN LA ESCUELA INFANTIL | NO ACUDIRA A LA ESCUELA... |
|--|--|
| CONJUNTIVITIS AGUDA INFECCIOSA | Hasta 24 horas después del inicio del tratamiento. |
| GASTROENTERITIS VIRICAS | Hasta 2 días con deposiciones consistentes (no líquidas ni blandas). Mientras haya vómitos, diarrea, fiebre o afectación del estado general. |
| INFECCIONES RESPIRATORIAS | Siempre que exista una afectación del estado general y/o fiebre y/o tos intensa y/o congestión importante de vías altas. |
| PIOJOS | Hasta iniciar tratamiento. |
| INFECCIONES DE PIEL Y MUCOSAS Impétigo(infección cutánea) Muguet (Micosis de la mucosa bucal) | 24 horas después de iniciar el tratamiento de antibiótico. |
| VARICELA | Hasta 7 días desde el comienzo de la erupción, y cuando las lesiones estén en fase de cicatrización. |
| RUBEOLA | Hasta 5 días después del comienzo de la erupción |
| EXANTEMA SUBITO | Durante la fase de fiebre (que es alta y dura 3 días) . Hasta diagnóstico de pediatra. |
| ESCARLATINA | Al menos 4 días tras inicio del tratamiento antibiótico y 24h estado afebril. |
| SALMONELOSIS, CAMPYLOBACTER U OTRA INFECCIÓN GASTRO-INTESTINAL BACTERIANA | Mientras tenga deposiciones líquidas y/o blandas y/o muy malolientes. En todo caso seguir recomendaciones del pediatra. |
| PARASITOSIS INTESTINAL (oxiuros, giardiasis...) | No requiere exclusión de la escuela si lleva el tratamiento indicado por su pediatra y lo notifica al personal educador. |
| TOSFERINA | Hasta 5 días después iniciado el tratamiento |